

les oiseaux d'intérêt patrimonial au Maroc



Mohammed Aziz EL AGBANI & Abdeljebbar QNINBA

avec la collaboration de

Mohamed RADJ, Rhimou EL HAMOUMI, Imad CHERKAOUI
Oumnia HIMMI, Adel BOUAJAJA & Mohamed DAKKI

les oiseaux d'intérêt patrimonial au Maroc

Mohammed Aziz EL AGBANI & Abdeljebbar QNINBA

avec la collaboration de
Mohamed RADI, Rhimou EL HAMOUMI, Imad CHERKAOUI
Oumnia HIMMI, Adel BOUAJAJA & Mohamed DAKKI

Décembre 2011

Ce document a été produit dans le cadre du projet “Renforcement des ONG locales pour la mise en oeuvre des accords environnementaux au Maroc” financé par l’Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le développement et exécuté par SEO/BirdLife.

Nous remercions M. & M. J. CRIADO & J. F. ORUETA de SEO/BirdLife pour leurs précieux conseils.

Nous remercions, particulièrement, les auteurs des photographies qui n’ont pas hésité à nous fournir leur plus belles photos :

A. LOPÉZ (<http://www.countrysessions.org>), I. CHERKAoui, A. D. PASTOR, S. LAHROUZ, R. MASSOLI-NOVELLI (<http://www.massolinovelli.it>), J. F. ORUETA, E. AYALA (1er prix FotoAves 2009), J. L. OJEDA-NAVIO (<http://www.jlojeda.com>), G. POISSON, J. M. SIMON, J. PIRIS, R. ALDER, C. G. EXPOSITO, M. ROUCO, G. SIERRA, A. COMAS, G. OLIOSO (www.oiseaux.net), B.V. GEMERDEN, L. KISLEV, J. SAUNDERS (<http://hedgelandtales.blogspot.com>), P. PALMER (www.BirdHolidays.co.uk), R. BELTERMAN.

©Publication du GREPOM n°3 Edition décembre 2011

Dépot légal : 2011 Mo 2983

ISSN : 2028-2176

ISBN : 978-9954-529-06-5

Impression : ADAMS GRAPHIC

Sommaire

Introduction	i
Fiches des espèces	v
<i>Tadorna ferruginea</i> Tadorne casarca Ruddy Shelduck	1
<i>Marmonetta angustirostris</i> Sarcelle marbrée Marbled Teal	2
<i>Netta rufina</i> Nette rousse Red-crested Pochard	3
<i>Aythya nyroca</i> Fuligule nyroca Ferruginous Duck	4
<i>Oxyura leucocephala</i> Erismature à tête blanche White-headed Duck	5
<i>Alectoris barbara</i> Perdrix gambra Barbary Partridge	6
<i>Francolinus bicalcaratus ayesha</i> Francolin à double éperon Double-spurred Francolin	7
<i>Phalacrocorax carbo maroccanus</i> Grand Cormorant Cormorant	8
<i>Phalacrocorax aristotelis riggenbachi</i> Cormoran huppé Shag	9
<i>Botaurus stellaris</i> Butor étoilé (Great) Bittern	10
<i>Ixobrychus minutus</i> Blongios nain Little Bittern	11
<i>Nictycorax nictycorax</i> Bihoreau gris Black-crowned Night Heron	12
<i>Ardeola ralloides</i> Crabier chevelu Squacco Heron	13
<i>Ardea purpurea</i> Héron pourpré Purple Heron	14
<i>Plegadis falcinellus</i> Ibis falcinelle Glossy Ibis	15
<i>Geronticus eremita</i> Ibis chauve Northern Bald Ibis	16
<i>Platalea leucorodia</i> Spatule blanche Eurasian Spoonbill	17
<i>Milvus milvus</i> Milan Royal Red Kite	18
<i>Gypaetus barbatus barbatus</i> Gypaète barbu Lammergeier	19
<i>Neophron percnopterus</i> Percnoptère d'Égypte Egyptian vulture	20
<i>Gyps fulvus</i> Vautour fauve Griffon Vulture	21
<i>Melierax metabates theresae</i> Autour chanteur sombre Dark Chanting Goshawk	22
<i>Aquila rapax belisarius</i> Aigle ravisseur Tawny Eagle	23
<i>Pandion haliaetus</i> Balbuzard pêcheur Osprey	24
<i>Falco naumanni</i> Faucon crécerelle Lesser Kestrel	25
<i>Falco eleonora</i> Faucon d'Éléonore Eleonora's Falcon	26
<i>Turnix sylvatica</i> Turnix d'Andalousie Andalusian Buttonquail	27
<i>Porphyrio porphyrio</i> Talève sultane Purple Gallinule	28
<i>Fulica cristata</i> Foulque caronculée Red-knobbed Coot	29
<i>Tetrax tetrax</i> Outarde canepetière Little Bustard	30
<i>Chlamydotis undulata</i> Outarde houbara Houbara Bustard	31
<i>Otis tarda</i> Grande Outarde Great Bustard	32
<i>Larus audouinii</i> Goéland d'Audouin Audouin's Gull	33
<i>Pterocles lichtensteinii</i> Ganga de Lichtenstein Lichtenstein's Sandgrouse	34
<i>Pterocles coronatus</i> Ganga couronnée Crowned Sandgrouse	35
<i>Pterocles senegallus</i> Ganga tacheté Spotted Sandgrouse	36
<i>Asio capensis tingitanus</i> Hibou du Cap Marsh Owl	37

<i>Merops persicus</i> Guêpier de Perse Blue-cheeked Bee-eater	38
<i>Picus vaillantii</i> Pic de Levillant Levillant's Green Woodpecker	39
<i>Chersophilus duponti</i> Sirli de Dupont Dupont's Lark	40
<i>Eremophila alpestris atlas</i> Alouette haussecol Shore Lark	41
<i>Riparia paludicola mauritanica</i> Hirondelle paludicole Brown-throated Sand Martin	42
<i>Prunella collaris</i> Accenteur alpin Alpine Accentor	43
<i>Phoenicurus moussieri</i> Rougequeue de Moussier Moussier's Redstart	44
<i>Oenanthe oenanthe seebohmii</i> Traquet de Seebohm Seebohm's Weatear	45
<i>Scotocerca inquieta theresae</i> Dromoïque du desert Scrub Warbler	46
<i>Sylvia deserti</i> Fauvette du desert African Desert Warbler	47
<i>Sylvia deserticola maroccana</i> Fauvette de l'Atlas Tristram's Warbler	48
<i>Ficedula speculigera</i> Gobemouche de l'Atlas Atlas Flycatcher	49
<i>Turdoides fulva maroccanus</i> Cratérope fauve Fulvous Babbler	50
<i>Cyanistes teneriffae</i> Mésange maghrébine African Blue Tit	51
<i>Tchagra senegalus</i> Tchagra à tête noire Black-crowned Tchagra	52
<i>Corvus ruficollis</i> Corbeau brun Brown-necked Raven	53
<i>Rhodopechys sanguineus</i> Roselin à ailes roses Crimson-winged Finch	54
<i>Emberiza schoeniclus witherbyi</i> Bruant des roseaux Reed Bunting	55
Annexes	vii
Références consultées	ix
Tableau récapitulatif des espèces patrimoniales	xi

introduction

La progression notable des études et des efforts d'observation ornithologiques sur un siècle au Maroc a permis d'élever le nombre d'espèces d'oiseaux d'occurrence certaine de 177 en 1914 (Vaucher & Vaucher 1915) à 481 espèces en 2009 (Bergier & Thévenot 2010). Ceci grâce notamment au maintien de pression d'observation de visiteurs étrangers mais surtout à une forte implication des ornithologues nationaux et une meilleure couverture de tout le territoire national, particulièrement les provinces sahariennes du sud, ceci, principalement durant les vingt dernières années et en grande partie sous l'impulsion du Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM).

En dépit de l'accumulation et de la richesse de ces données ornithologiques, le Maroc ne dispose pas encore d'une liste rouge de ses oiseaux nicheurs qui s'élèvent à 240 espèces.

Des tentatives d'élaboration de cette liste ont été initiées, soit lors de travaux de synthèse sur certaines espèces (El Agbani *et al.* 1996), soit pour les espèces nicheuses des oiseaux d'eau du Maroc (Thévenot & Qninba 2003), soit lors d'atelier consacré spécialement à cette problématique (14 décembre 2006 à Rabat) sous la coordination de A. Qninba et avec l'appui du GREPOM en présence d'un représentant de l'IUCN.

Nous avons voulu, avec ce document sur les 'Oiseaux d'intérêt patrimonial au Maroc', procéder à une action d'information et de sensibilisation sur les espèces d'oiseaux qui sont en situation de menace et de vulnérabilité ou présentant une valeur biogéographique indéniable et que cette action serait une initiation à la mise en oeuvre d'un projet de liste rouge des oiseaux du Maroc.

Cette action est d'autant plus justifiée que depuis le début du XXème siècle, neuf espèces d'oiseaux d'une grande valeur patrimoniale et qui nichaient régulièrement au Maroc ont disparu; il s'agit de l'Autruche d'Afrique *Struthio camelus*, du Flamant rose *Phoenicopterus roseus*, du Canard pilelet *Anas acuta*, du Vautour oricou *Torgos tracheliotus*, du Vautour moine *Aegypius monachus*, de la Grue demoiselle *Grus virgo*, de l'Aigle impérial ibérique *Aquila adalberti*, de la Pintade de Numidie *Numida meleagris sabyi* et de l'Outarde arabe *Ardeotis arabs lynesi*, ces deux dernières ayant été des endémiques marocaines.

Sur les 240 espèces d'oiseaux régulièrement nicheuses au Maroc, nous avons sélectionné, après application d'un certain nombre de critères, 95 que nous avons considéré ayant une valeur patrimoniale (Qninba *et al.* sous presse).

Pour les oiseaux d'eau nicheurs, les critères de 'statut de conservation défavorable' de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ont été appliqués en se basant sur la synthèse sur les effectifs et sites de reproduction réalisée par Thévenot et Qninba (2003). Ce qui a permis d'identifier et de ressortir les quatre catégories de menaces: 'En danger', 'Vulnérable', 'Rare' et en 'Déclin' (voir Fiches en corps du texte et Tableau récapitulatif en annexe).

Pour le reste des espèces, notamment les espèces terrestres d'occurrence certaine au Maroc, l'attribution de la valeur patrimoniale a été basée sur les critères d'endémisme, de statuts de conservation défavorables au niveau mondial, national ou régional, de valeurs biogéographiques ou de représentativité écologique.

Parmi les 95 espèces ayant une valeur patrimoniale, nous avons présenté 55 espèces sous forme de fiches individuelles où apparaissent les noms scientifiques, français, anglais, espagnol, arabe et éventuellement amazigh avec une illustration photographique prise dans la majorité des cas par des membres du GREPOM.

Pour chaque espèce, nous avons précisé le statut de conservation, la valeur biogéographique, le statut phénologique, l'aire de répartition, les habitats et, éventuellement, les effectifs des populations. L'ouvrage de Thévenot *et al.* (2003) sur les Oiseaux du Maroc a été précieux dans cet exercice.

Nous avons choisi de détailler l'information pour ces 55 espèces parcequ'elles constituent, globalement, les éléments clés qui présentent les plus forts degrés de menace et de vulnérabilité et/ou des valeurs biogéographiques ou de représentativité écologique intéressantes.

Notons que les 95 espèces identifiées présentent la grande majorité de leurs populations au niveau du réseau des aires protégées identifiées au Maroc (AEFCS 1996) en général et au niveau des 24 zones humides Ramsar marocaines particulièrement pour les oiseaux d'eau puisque ces derniers constituent près de la moitié des espèces patrimoniales identifiées.

Nous espérons que ce document contribuera efficacement à l'amélioration de la prise de conscience sur les lourdes menaces qui pèsent sur une partie significative du peuplement avien de notre pays.

Fiches des espèces


Endanger

Vulnérable

Menacé de disparition


Rare et localisé

Statut inconnu



Tadorna ferruginea

شهرمان أصدأ
Tadorne casarca
Ruddy Shelduck
Tarro canelo



© I. CHERKAOUI

STATUT DE CONSERVATION

Vulnérable

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Le Maroc abrite une part importante de la population régionale de la méditerranée occidentale

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Moyen, Haut et Anti Atlas, Maroc oriental, Vallées de Ziz et du Bas Draa, Sud-ouest marocain

HABITAT

Etendues d'eau et prairies adjacentes, estuaires sahariens, lacs de montagne et de retenues artificielles, plan d'eau temporaires

EFFECTIFS

750 à 1250 couples

Marmaronetta angustirostris

حذف رخامي
Sarcelle marbrée
Marbled Teal
Cerceta pardilla



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

En danger au Maroc; Vulnérable mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Le Maroc abrite une importante proportion de la population régionale de la méditerranée occidentale en période d'hivernage

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire, hivernant et migrateur de passage

AIRE DE RÉPARTITION

Gharb, Maroc oriental, Saiss, Maroc central, Souss et Sud-ouest marocain

HABITAT


Marais et plans d'eau douce à saumâtre à végétation rivulaire émergente et persistante

EFFECTIFS

50 à 250 couples nicheurs; 2000 à 2500 hivernants

Netta rufina

بط رؤاسي
Nette rousse
Red-crested Pochard
Pato colorado



© A.D. PASTOR

STATUT DE CONSERVATION Vulnérable

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE Nicheur sédentaire rare en expansion; Hivernant

AIRE DE RÉPARTITION Gharb et Saïss

HABITAT Merjas, marais et plans d'eau relativement profonds à végétation rivulaire émergente

EFFECTIFS 10-50 couples nicheurs. Quelques centaines d'individus en période d'hivernage

Aythya nyroca

غريرة صباء
Fuligule nyroca
Ferruginous Duck
Porrón pardo



© A.D. PASTOR

STATUT DE CONSERVATION

En danger au Maroc; Quasi-menacé mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire rare, hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Bas Loukkos, Sidi Bou Ghaba, Douiyet et Massa; Suspecté nicheur dans certains lacs du Moyen Atlas et dans les mares temporaires de Benslimane

HABITAT

Marais et lacs à végétation émergente dense


EFFECTIFS

10 à 25 couples nicheurs; 100 à 150 hivernants

Oxyura leucocephala

بط شوال

Erismature à tête blanche
White-headed Duck
Malvasía cabeciblanca



© S. LAHROUZ

STATUT DE CONSERVATION

En danger au Maroc; En danger mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Réapparu après avoir disparu du Maroc

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire très rare et très localisé; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Reproducteur régulier actuellement au niveau de Sidi Bou Ghaba et de Douiyet; certains plans d'eau du Maroc Oriental reçoivent des hivernants

HABITAT

Marais et plans d'eau douce à saumâtre riche en végétation émergente et persistante

EFFECTIFS

Quelques dizaines de couples reproducteurs; quelques individus en hiver

Alectoris barbara

جبل مغاربي
تسكورت

Perdrix gabra
Barbary Partridge
Perdiz moruna



© R. MASSOLI-NOVELLI

STATUT DE CONSERVATION

Espèce gibier

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Endémique d'Afrique du Nord

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Tout le territoire national; néanmoins, dans les zones semi-désertiques et désertiques, la distribution n'est pas homogène

HABITAT


Plusieurs types d'habitats présentant suffisamment de couvert végétal, notamment ceux avec une mosaïque d'habitats boisés, de clairières et des terrains agricoles

EFFECTIFS

Non disponible

Francolinus bicalcaratus

دراج أبو طيحين
Francolin à double éperon
Double-spurred Francolin
Francolín biespolado



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition au Maroc

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Représenté au Maroc par la sous espèce endémique F.b. ayesha

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Restreint à un petit nombre de localités: Sidi Yahya des Zaër, Sidi Bet-tache, Benslimane, Maamora

HABITAT

Mattoral dense à base de lentisque ou d'oleastre, formations claires de thuya, de chêne liège et vert avec un sous-bois significatif

EFFECTIFS

Quelques centaines d'individus au plus

Phalacrocorax carbo maroccanus

غاق مغربي
Grand cormoran
Cormorant
Cormoràn grande



©GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Rare et assez localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique marocaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Côte atlantique depuis Essaouira jusqu'à la province de Lagouira. Des individus issus d'une population captive au Parc Zoologique de Rabat commencent à fréquenter la côte de Rabat-Salé

HABITAT

Falaises et rebords rocheux des côtes marines et des îles

EFFECTIFS

300 à 400 couples

Phalacrocorax aristotelis riggenbachii

غاق أرسطو ريكنبكي
Cormoran Huppé
Shag
Cormorán moñudo



© J. F. ORVETA

STATUT DE CONSERVATION

En danger car très localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique marocaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Côte de Haha, Souss et près de Sidi Ifni

HABITAT

Niche sur les rebords des hautes falaises côtières ainsi que dans les grottes marines

EFFECTIFS

20 à 40 couples

Botaurus stellaris

واق
Butor étoilé
(Great) Bittern
Avetoro común



© E. AYALA

STATUT DE CONSERVATION

Gravement menacé de disparition; très rare et très localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur; hivernant rare

AIRE DE RÉPARTITION

Marais du Bas Loukkos, du Bas Tahaddart et de la basse Moulouya

HABITAT

Marais d'eau douce des plaines avec une végétation aquatique dense formée essentiellement de roselières

EFFECTIFS

Moins de 10 mâles chanteurs

Ixobrychus minutus

واق صغير
Blangios nain
Little Bittern
Avetorillo común



© J. L. OJEDA NAVÍO

STATUT DE CONSERVATION

En danger; très rare et très localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur

AIRE DE RÉPARTITION

Barrage Mechra Homadi, Marais de Smir et du Bas Loukkos, embouchures des oueds Souss et Massa

HABITAT

Roselières denses étendues

EFFECTIFS

Moins de 50 couples

Nycticorax nycticorax

بلشون الليل
Bihoreau gris
Black-crowned Night Heron
Martinete común



© G. POISSON

STATUT DE CONSERVATION

Vulnérable

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur; hivernant très rare

AIRE DE RÉPARTITION

Péninsule Tingitane, Pré-Rif, Gharb, Saïss, Zaërs, Plateau Central, Moyen Atlas, Chaouïa, Haouz

HABITAT

Niche sur des arbres autour d'un lac, dans un marais ou le long d'une rivière

EFFECTIFS

500 à 1500 couples

Ardeola ralloides

واق أبيض صغير
Crabier chevelu
Squacco Heron
Garcilla cangrejera



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

En danger

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur; migrateur de passage; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Bas Loukkos, embouchure de la Moulouya, Smir-M'diq. Quelques paires sont observées dans le Tafilalet et dans le Haouz

HABITAT

Marais avec une épaisse végétation riveraine et aquatique (des arbres, des buissons ou des roseaux)

EFFECTIFS

15 à 85 couples

Ardea purpurea

بلشون أرجواني
Héron pourpré
Purple Heron
Garza imperial



© J. F. ORVETA

STATUT DE CONSERVATION

En danger

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; migrateur de passage; hivernant rare

AIRE DE RÉPARTITION

Localement dans le nord du pays (Bas Loukkos, Smir, embouchure de la Moulouya, Douyièt)

HABITAT

Roselières étendues. En dehors de la saison nuptiale, zones humides ouvertes bordées de végétation

EFFECTIFS

25 à 50 couples

Plegadis falcinellus

أبو منجل الأسود
Ibis falcinelle
Glossy Ibis
Morito comùn



© S. LAHROUZ

STATUT DE CONSERVATION

En danger comme nicheur

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur occasionnel; migrateur de passage; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Niche occasionnellement à M'diq près de Smir et à Massa.
Hiverné dans les marais du Tangérois, du Gharb, du Centre-Atlantique et du Souss

HABITAT

Roselières et ripisylves

EFFECTIFS

Quelques dizaines de couples nicheurs

Geronticus eremita

أبو منجل الأطلع
Ibis Chauve
Northern Bald Ibis
Ibis eremita



© I. CHERKAOUI

STATUT DE CONSERVATION

En danger au Maroc; En danger critique mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Le Maroc abrite plus de 98% de la population sauvage mondiale

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; migrateur partiel

AIRE DE RÉPARTITION

Tamri et Parc National de Souss-Massa. Des erratiques notés dans le Tangérois, au Moyen Atlas et dans les régions de Dakhla et Boujdour

HABITAT

Steppes et plaines arides ou semi-arides avec une végétation éparse, ainsi que zones cultivées et de pâturage. Niche dans des ruines et des falaises.

EFFECTIFS

Environ 110 couples

Platalea leucorodia

أبو ملعقة الأبيض
Spatule blanche
Eurasian Spoonbill
Espátula común



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Menacée de disparition, population nicheuse très localisée

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur occasionnel; migrateur de passage; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Une seule population nicheuse à Smir. En hivernage, essentiellement sur les zones humides côtières

HABITAT

Nidification dans un bosquet de Tamaris. En hiver et en migration, embouchures d'oueds, marais côtiers et lagunes

EFFECTIFS

12 à 15 couples

Milvus milvus

حداة حمراء
Milan royal
Red Kite
Milano real



© J. L. OJEDA NAVÍO

STATUT DE CONSERVATION

En danger critique d'extinction

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur très rare; hivernant rare

AIRE DE RÉPARTITION

Théoriquement, localement dans le Rif, dans le Moyen Atlas ainsi que dans les plaines et les collines de l'Oriental

HABITAT

Chênaies et cédraies

EFFECTIFS

Aucune donnée récente sur la population nicheuse

Gypaetus barbatus

نسر ملطي
مرز إخطاين
Gypaète barbu
Lammergeier
Quebrantahuesos



© J. L. OJEDA NAVÍO

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous espèce *G.b. barbatus* endémique du Maghreb; le Maroc abrite probablement les derniers individus de la population maghrébine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Actuellement, l'espèce survit dans le Haut Atlas Central et Occidental (Jbel Mgoun et Jbel Toubkal)

HABITAT

Principalement la haute montagne jusqu'à 3800m. Nidifie dans de hautes falaises inaccessibles

EFFECTIFS

quelques couples nicheurs

Neophron percnopterus

رخمة مصرية

إسرعي

Percnoptère d'Égypte

Egyptian Vulture

Alimoche común



© J. M. SIMON

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition en tant que nicheur

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur; migrateur de passage

AIRE DE RÉPARTITION

Commune à travers tout le pays jusqu'aux années 1970; ne subsisterait en tant que population reproductrice que dans le Moyen Atlas

HABITAT

Steppe et régions faiblement boisées avec des falaises pour nidifier

EFFECTIFS

Population reproductrice au bord de l'extinction; il subsisterait seulement quelques couples

Gyps fulvus

نسر جلفون
إدجيدر

Vautour fauve
Griffon Vulture
Buitre leonado



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition en tant que nicheur

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur; migrateur de passage

AIRE DE RÉPARTITION

Aucune observation récente de colonies reproductrices. Les zones potentielles seraient le Moyen Atlas, le Plateau Central, le Haut Atlas Central, l'Anti Atlas Occidental et l'Atlas Saharien entre Figuig et Bouarfa

HABITAT

Habitats ouverts ou semi-ouverts près des régions montagneuses. Il nidifie sur les rebords de falaises hautes

EFFECTIFS

Aucune donnée

Melierax metabates theresae

باز مغني قاتم اللون
Autour chanteur sombre
Dark Chanting Goshawk
Azor lagartijero oscuro



© J. PIRIS

STATUT DE CONSERVATION

En danger critique d'extinction

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du Maroc; d'origine Afro-tropicale

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Confiné à la Vallée du Souss entre Agadir et Aoulouz

HABITAT

Arganeraies et, accessoirement, oliveraies, palmeraies, orangeriaes et autres formations boisées épineuses

EFFECTIFS

Quelques individus subsisteraient encore

Aquila rapax belisarius

نسر أسمر مصفر
Aigle ravisseur
Tawny Eagle
Aguila rapaz



© R. ALDER

STATUT DE CONSERVATION

En danger de disparition

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique maghrébine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Souss et régions avoisinantes du Haut Atlas Occidental et Anti Atlas

HABITAT

Aires boisées et semi-boisées comme les forêts peu denses d'arganiers et les oliveraies

EFFECTIFS

Quelques dizaines de couples

Pandion haliaetus

عقاب السمك
Balbuzard pêcheur
Osprey
Aguila pescadora



© J. F. ORVETA

STATUT DE CONSERVATION

Population nicheuse en danger d'extinction

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; migrateur de passage; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Côte méditerranéenne du Rif entre Bou Ahmed et Al Hoceima

HABITAT

Niche sur les falaises côtières, îlots et rochers marins. Pêche le long du littoral marin et dans les plans d'eau continentaux, parfois très loin à l'intérieur des terres

EFFECTIFS

20 à 25 couples

Falco naumanni

عويسق - بوجرادة
Faucon crécerellette
Lesser Kestrel
Cernícalo primilla



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Nicheur rare

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur; migrateur de passage

AIRE DE RÉPARTITION

Bien réparti au nord du Haut Atlas; localisé dans l'Oriental, Haha et Souss

HABITAT

Chasse dans les habitats ouverts présentant des falaises et escarpements favorables à la nidification

EFFECTIFS

Environ 1000 couples ou un peu plus

Falco eleonora

باز إليونورا
Faucon d'Eléonore
Eleonora's Falcon
Halcón Eleonora



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Vulnérable

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Endémique de la région méditerranéenne bien qu'il existe trois colonies atlantiques au Maroc et dans les Canaries

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur

AIRE DE RÉPARTITION

Une colonie viable sur l'archipel d'Essaouira et une colonie menacée à Sidi Moussa au nord de Salé

HABITAT

Colonies reproductrices sur les îles-îlots et sur des falaises marines. Chasse les insectes, sur le littoral et à l'intérieur des terres, et les passe-reaux migrateurs près des colonies

EFFECTIFS

Environ 700 couples

Turnix sylvatica

زرکیل
Turnix d'Andalousie
Andalusian Buttonquail
Torillo andaluz



© C. G. EXPOSITO

STATUT DE CONSERVATION

En danger de disparition

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Origine Indo-Africaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Zone côtière entre Sidi El Abed au sud d'El Jadida et Safi ainsi que dans l'arrière-pays de Sidi Moussa

HABITAT

Dans les maraichages et autres champs de culture dans la zone côtière; dans une végétation mixte (Doum, Rétame, Genêt) dans l'arrière-pays

EFFECTIFS

Population très réduite; au plus, quelques dizaines d'individus

Porphyrio porphyrio

غرة زرقاء
Talève sultane
Purple Gallinule
Calamón común



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

En danger

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Origine Indo-Africaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Marais de Smir, du Bas Tahaddart, du Bas Loukkos, de l'embouchure de la Moulouya, à Merja Zerga, à Bargha, à Sidi Bou Ghaba, à Oulfa (Casablanca) et à Massa

HABITAT

Roselières pratiquement impénétrables autour des plans d'eau douce ou saumâtres

EFFECTIFS

Environ 200 couples

Fulica cristata

غرة قرناء

Foulque caronculée
Red-knobbed Coot
Focha moruna



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Vulnérable

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Origine tropicale

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Nord du pays, plus spécialement sur les sites côtiers atlantiques et dans le Moyen Atlas

HABITAT

Marais d'eaux douces naturelles ou artificielles avec une dense végétation aquatique

EFFECTIFS

600 à 1000 couples

Tetrax tetrax

جباري صغيرة
Outarde canepetière
Little Bustard
Sisón común



© M. Rouco

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition au Maroc; Quasi-menacé mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Aucune

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Péninsule Tingitane, nord de la Plaine du Gharb et région de Benslimane-Sidi Bettache

HABITAT

Plaines à végétation buissonnante basse où l'on pratique une céréaliculture traditionnelle

EFFECTIFS

Non disponible

Chlamydotis undulata

جباري

Outarde houbara
Houbara Bustard
Avutarda Hubara



© A.D. PASTOR

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition au Maroc; vulnérable mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Espèce saharienne, endémique de l'Afrique du Nord

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Plateaux et plaines du Sahara oriental et occidental. Hauts plateaux de l'Orient et de la moyenne et haute Moulouya

HABITAT

Plaines et plateaux peu vallonnées à végétation buissonnante steppique, semi-désertique à désertique

EFFECTIFS

Estimés à 1 couple par 36 km² dans la région de Boudnib et 1 couple par 15 km² dans la région de Merzouga

Otis tarda

جبارى كبيرة
Grande Outarde
Great Bustard
Avutarda común



© G. SIERRA

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition au Maroc; vulnérable mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Unique population Africaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Péninsule Tingitane: Plaines entre Tanger et Asilah; Gharb: Plaines des régions de Larache et Souk El Arba

HABITAT

Plaines plates ou peu vallonnées à végétation herbacée basse ou dans des terrains de céréaliculture; habitats à palmiers nains entrecoupés de culture céréalières

EFFECTIFS

Population marocaine estimée à moins d'une centaine d'individus

Larus audouinii

نورس أودوين
Goéland d'Audouin
Audouin's Gull
Gaviota de Audouin



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Vulnérable comme nicheur; Quasi-menacé mondialement

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Endémique de la région méditerranéenne

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; migrateur de passage; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Importante colonie au niveau des îles Chaffarines; niche ailleurs, le long de la côte méditerranéenne, en petites colonies sur les îlots et rochers marins ou sur la côte

HABITAT

Aires abritées et pentes douces couvertes de buissons épars; falaises et éboulis côtiers ainsi que rochers des îlots

EFFECTIFS

Chaffarines: entre 1000 et 4300 couples; près de Melilia et sur la côte des Bokkoya: environ 60 couples

Pterocles lichtensteinii

قطا ليشنشتاين

Ganga de Lichtenstein
Lichtenstein's Sandgrouse
Ganga de Lichtenstein



© G. POISSON

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Espèce saharienne

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Uniquement dans l'est du Sahara entre Jbel Bani (Anti Atlas) et le cours moyen de l'Oued Draa. Présence possible dans la région de Saquia Al Hamra

HABITAT

Collines et ravins rocaillieux; vallées sèches avec buissons épars

EFFECTIFS

Non disponible

Pterocles coronatus

قطا متوجة
Ganga couronné
Crowned Sandgrouse
Ganga coronada



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Espèce saharienne

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Tout le Sahara marocain; la limite nord de distribution serait schématisée par une ligne allant de Figuig à Guelmim

HABITAT

Désert rocailleux (reg), pentes rocheuses avec végétation éparse

EFFECTIFS

Non disponible

Pterocles senegallus

قطا مرقطة
Ganga tacheté
Spotted Sandgrouse
Ganga moteada



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Espèce saharienne

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; nicheur migrateur partiel

AIRE DE RÉPARTITION

Sahara au sud d'une ligne reliant Figuig à Guelmim; distribution sous forme de tâches

HABITAT

Terrains alluviaux plats et plaines sableuses des régions sahariennes, terrains pierreux de type reg

EFFECTIFS

Non disponible

Asio capensis tingitanus

بومة الكاب الطنجتانية
Hibou du Cap
Marsh Owl
Búho moro



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Très localisé; menacé de disparition

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique marocaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Marais de la façade atlantique de la péninsule Tingitane et du Gharb

HABITAT

Zones humides côtières permanentes bordées de végétation aquatique. Nidifie sur le sol dans la végétation aquatique, parfois dans les champs de céréales

EFFECTIFS

50 à 140 couples

Merops persicus

وروار الفرس
أيمون

Guêpier de Perse
Blue-cheeked Bee-eater
Abejaruco persa



© A. COMAS

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Origine Indo-Africaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Estivant nicheur

AIRE DE RÉPARTITION

Vallées des oueds Guir et Bouanane (Maroc Oriental), du Tafilalet, Dadès et Draa (sud-est du Pays)

HABITAT

Berges sablonneuses ou gravier de cours d'eau désertiques ou de canaux d'irrigation dans des oasis à palmeraies

EFFECTIFS

Non disponible

Picus vaillantii

نقار الشجر لوفايان
أبو نقاب

Pic de Levillant
Levaillant's Green Woodpecker
Pito real bereber



© G. OLIO

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Endémique d'Afrique du Nord

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Massifs forestiers de la moitié nord du Pays

HABITAT

Massifs forestiers à base des principales essences du Maroc depuis le niveau de la mer jusqu'à 2500 m d'altitude mais également dans des palmeraies et oliveraies

EFFECTIFS

Non disponible

Chersophilus duponti

قبرة دوبون
Sirli de Dupont
Dupont's Lark
Alondra ricotí



© G. SIERRA

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Endémique Ibéro-Maghrébin

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Hauts plateaux orientaux, vallée de la moyenne et haute Moulouya.
Récemment retrouvé localement dans l'Anti Atlas central

HABITAT

Steppes à alfa et armoise au dessous de 1000 m d'altitude

EFFECTIFS

2000 à 3000 couples

Eremophila alpestris atlas

قبرة قرناء أطلسية
Alouette haussecol
Shore Lark
Alondra cornuda



© B. V. GEMERDEN

STATUT DE CONSERVATION

Très localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du Maroc. Confinée aux habitats montagnards

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Moyen Atlas occidental au dessus de 1900 m, plus localisé dans le Moyen Atlas oriental où il niche au dessus de 2300 m; Haut Atlas entre 2000 et 3600 m. Présent également sur Jbel Siroua (Anti Atlas)

HABITAT

Terrains pierreux et rocailleux avec végétation éparse d'épineux et de xérophytes

EFFECTIFS

Non disponible

Riparia paludicola mauritanica

خطاف أسمر الصدر الموريتاني
تيفليست
Hirondelle paludicole
Brown-throated Sand Martin
Avión paludícola



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du Maroc.

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Plaines et plateaux centre-atlantiques et Souss. L'espèce a montré ces dernières décennies une expansion vers le nord; elle vient tout juste de coloniser le Bas Loukkos

HABITAT

Bancs de sable, argile et limon le long des vallées et gorges, parfois dans des mines ou dans des marais

EFFECTIFS

Non disponible

Prunella collaris

عصفور الشوك الألبى
Accenteur alpin
Alpine Accentor
Acentor alpino



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Nicheur rare et très localisé, donc menacé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Le Maroc abrite la seule population reproductrice au niveau de l'Afrique

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Zones montagneuses situées à des altitudes supérieures à 3000 m dans le Haut Atlas. Partie orientale du Moyen Atlas

HABITAT

Sommets de montagne régulièrement enneigés culminant au delà de 2900 m, avec sol rocailleux parsemé de xérophytes ou dans les pelouses alpines avec rochers

EFFECTIFS

Moins de 1000 couples nicheurs

Phoenicurus moussieri

حميراء موسيبي
Rougequeue de Moussier
Moussier's Redstart
Colirrojo diademado



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Endémique d'Afrique du Nord

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; erratique en dehors de la saison de reproduction

AIRE DE RÉPARTITION

Rif occidental et central, Maroc oriental, Moyen Atlas, Haut Atlas, Souss, Anti Atlas occidental, Bas Draa

HABITAT

Divers habitats rocaillieux et buissonnants (avec ou sans arbres dispersés), des collines steppiques et zones xérophytiques au-dessus de la limite des arbres

EFFECTIFS

Non disponible

Oenanthe oenanthe *seebohmi*

حباد سييڤوم

Traquet de Seebohm
Seebohm's Weatear
Collaba de Seebohm



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique Marocco-Algérienne

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur; hivernant occasionnel

AIRE DE RÉPARTITION

Rif, Maroc oriental, Moyen Atlas au dessus de 1500 m et dans le Haut Atlas central entre 1800 et 3200 m

HABITAT

Terrains pierreux et rochers nus avec végétation basse clairsemée des sommets et plateaux de montagne

EFFECTIFS

Non disponible

Scotocerca inquieta theresae

هازجة الشجيرات
Dromoïque du désert
Scrub Warbler
Prinia desértica



© L. KISLEV

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du sud-ouest du Maroc; d'origine tropicale. Une autre sous-espèce (*S.i.saharae*), non endémique est également présente dans le pays (est et sud du Maroc)

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Anti Atlas occidentale, Bas Draa, régions de Tarfaya et de Saquia Al Hamra

HABITAT

Terrains désertiques sableux ou caillouteux, lits d'oueds à sec et pentes rocheuses avec couvert végétal

EFFECTIFS

Non disponible

Sylvia deserti

هازجة الصحراء
أسفلاو

Fauvette du désert
African Desert Warbler
Curruca sahariana



© J. SAUNDERS

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Espèce saharienne, endémique d'Afrique du Nord

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; estivant nicheur ?

AIRE DE RÉPARTITION

Tafilalet, sud-est Sahara, Atlas Saharien, Dadès-Draa, Moyen et Bas Draa, Saquia Al Hamra, Oued Eddahab

HABITAT

Sable désertique à végétation clairsemée, lits désertiques asséchés avec touffes de végétation clairsemée, sols désertiques caillouteux, sablonneux et végétalisés

EFFECTIFS

Non disponible

Sylvia deserticola maroccana

هازجة الأطلس المغربية
أسفلو

Fauvette de l'Atlas
Tristram's Warbler
Curruca de Tristram



© P. PALMER

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du Maroc d'une espèce endémique du Maghreb

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; estivant nicheur, hivernant

AIRE DE RÉPARTITION

Haut Atlas (1000 à 2800 m), Maroc Oriental (800 à 1200 m), Moyen Atlas oriental (2000 à 2200 m), Anti Atlas central et occidental (800 à 2300 m)

HABITAT

Sols rocaillieux à végétation buissonnante et arbres-arbustes très dispersés, collines à steppe d'alfa

EFFECTIFS

Non disponible

Ficedula speculigera

خطاف الذباب الأطلسي

Gobemouche de l'Atlas

Atlas Flycatcher

Papamoscas del Atlas



© I. CHERKAOUI

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Espèce endémique de l'Afrique du Nord

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur migrateur

AIRE DE RÉPARTITION

Rif, Maroc Oriental, Moyen Atlas, Plateau Central, Haut Atlas

HABITAT

Forêts montagneuses et humides, ripisylves de montagne et forêts de bétoum à plus de 1000 m dans l'Oriental

EFFECTIFS

Environ 5000 couples nicheurs

Turdoides fulva maroccanus

ثرثارة سمراء مغربية
Cratérope fauve
Fulvous Babbler
Alzacola rojizo



© G. OLIOSSO

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du Maroc et du nord-ouest du Sahara algérien; espèce saharienne d'origine tropicale

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Depuis le sud-ouest jusqu'à l'extrême sud du Maroc. Egalement Sahara oriental jusqu'à Figuig. Une toute petite population résiduelle au nord du Haut Atlas

HABITAT


Fréquente essentiellement les régions désertiques arides avec de larges broussailles épineuses (*Ziziphus*, *Acacia*) et arbustes de palmiers en touffes

EFFECTIFS

Non disponible

Cyanistes teneriffae *ultramarinus*

قرقف مغاربية قاتمة الزرقة
Mésange maghrébine
Moghrebian Tit
Carbonero del Maghreb



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

L'espèce est endémique d'Afrique du Nord et des Îles Canaries; la sous-espèce est endémique d'Afrique du Nord

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire; hivernant occasionnel ?

AIRE DE RÉPARTITION

Largement répandu excepté dans les steppes et zones désertiques de l'est et du sud marocain

HABITAT

Zones boisées depuis le niveau de la mer jusqu'à 2500 m d'altitude

EFFECTIFS

Non disponible

Tchagra senegalus cucullatus

سرندل أسود الرأس
أحدجيو

Tchagra à tête noire
Black-crowned Tchagra
Chagra del Senegal



© P. PALMER

STATUT DE CONSERVATION

Aucun

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du nord -ouest de l'Afrique; d'origine tropicale

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Basse Moulouya, péninsule Tingitane et Rif méridional, Gharb, Zem-mour, Zaër, Chaouia, entre Srarhna et Tadla, Chiadma, Haut Atlas occidental, Souss, Anti Atlas occidental et Bas Draa

HABITAT

Du niveau de la mer jusqu'à 900 m. Fréquente principalement la végétation arbustive claire

EFFECTIFS

Non disponible

Corvus ruficollis

غراب أسمر القفي
تدكارت
Corbeau brun
Brown-necked Raven
Cuervo desérticola



© GREPOM

STATUT DE CONSERVATION

Menacé par l'empoisonnement utilisé dans la lutte contre les chacals et les chiens errants

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Espèce saharienne

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Plaines et hauts plateaux de l'ouest du Sahara. Au Sahara oriental, dans les bassins de la moyenne Draa, Dadès et Tafilalet et jusqu'aux hauts plateaux orientaux

HABITAT

Plaines et plateaux de steppes à arbres clairsemés d'acacia et de pistachier

EFFECTIFS

Non disponible

Rhodopechys sanguineus aliena

حسون قرمزي الجناح
Roselin à ailes roses
Crimson-winged Finch
Camachuelo alirrojo



© I. CHERKAoui

STATUT DE CONSERVATION

Très localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique du Maroc et d'Algérie. Confinée aux massifs montagneux

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Moyen Atlas oriental, Haut Atlas et Anti Atlas central

HABITAT

Sommets rocaillieux et plateaux pierreux au-dessus de 2600 m dans le Haut Atlas et 2400 m dans le Moyen Atlas

EFFECTIFS

Non disponible

Emberiza schoeniclus witherbyi

درسة القصب وايتربي
Bruant des roseaux
Reed Bunting
Escribano palustre



© R. BELTERMAN

STATUT DE CONSERVATION

Menacé de disparition; très localisé

VALEUR BIOGÉOGRAPHIQUE

Sous-espèce endémique Ibero-Maghrebine; seule population africaine

STATUT PHÉNOLOGIQUE

Nicheur sédentaire

AIRE DE RÉPARTITION

Marais du Gharb; actuellement, seulement dans ceux du bas loukkos

HABITAT

Phragmites, thyphaies, jonchaies

EFFECTIFS

environ 10 couples

annexes

références consultées

AEFCS (Administration des Eaux et Forêts et de la conservation des sols). 1996. Plan Directeur des Aires Protégées. BCEOM/SEC, BAD, EPHE, ISR, IB, Rabat.

BERGIER P. & THÉVENOT M. 2010. Liste des oiseaux du Maroc. Mise à jour février 2010 (rév. 3.0). *Go-South Bull.*, 7: 15-55.

DAKKI M., QNINBA A., EL AGBANI M.A. & BENHOUSSE A. 2002. Recensement hivernal d'oiseaux d'eau au Maroc: 1996-2000. *Trav. Inst. Sci., Rabat, Sér. Zool.*, n° 45, 28.

EL AGBANI M.A., BAYED A., DAKKI M. & QNINBA A. 2002. Découverte d'une colonie reproductrice de Spatule blanche *Platalea leucorodia* dans le Nord-Ouest du Maroc. IN VEEN J. & STEPANOVA O. "Wetland management for Spoonbills and associated waterbirds". *Report of the 68th EURO-SITE Workshop, 19-22 April 2002, Texel, The Netherlands*, p: 38-40

EL AGBANI M.A., DAKKI M., THÉVENOT M. & BEAUBRUN P.C. 1996. Statut actuel au Maroc d'une espèce globalement menacée, la Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris*. *Bull. Inst. Sci., Rabat*, n°20: 163-180.

QNINBA A., EL AGBANI M.A., DAKKI M. & THÉVENOT M. 2006. Les Oiseaux. In "Atlas des Aires Protégées du Maroc". HCEFLCD.

THÉVENOT M. & QNINBA A. 2003. *Oiseaux d'eau nicheurs du Maroc*. Projet d'Inscription de nouveaux Sites sur la Liste Ramsar des Zones Humides d'Importance Internationale. WWF International - HCEFLCD- Inst. Sci., Rabat, Projet n° 9E0702.01.

THÉVENOT M., VERNON R. & BERGIER P. 2003. "The Birds of Morocco. British Ornithologists" Union Check List, Tring. 594 pp.

VAUCHER H. & VAUCHER A. 1915. Liste des Oiseaux observés au Maroc de 1884 à 1914. *Revue française d'ornithologie* 4: 94-96, 107-111, 134-137.

Tableau récapitulatif des espèces patrimoniales

<i>Tadorna ferruginea</i>	Vulnérable
<i>Anas strepera</i>	En danger comme nicheur
<i>Marmonetta angustirostris</i>	En danger, vulnérable mondialement comme nicheur
<i>Netta rufina</i>	Vulnérable
<i>Aythya ferina</i>	En danger
<i>Aythya nyroca</i>	En danger, quasi menacée mondialement
<i>Oxyura leucocephala</i>	En danger, en danger mondialement
<i>Alectoris barbara</i>	Endémique d'Afrique du Nord
<i>Fringilla bitorquatus ayesha</i>	Sous-espèce endémique marocaine, menacée de disparition
<i>Podiceps cristatus</i>	Rare comme nicheur
<i>Podiceps nigricollis</i>	En danger comme nicheur
<i>Calonectris diomedea</i>	Endémique de la région méditerranéenne
<i>Phalacrocorax carbo maroccanus</i>	Sous-espèce endémique marocaine, rare.
<i>Phalacrocorax aristotelis riggenbachi</i>	Sous-espèce endémique marocaine, en danger et très localisée
<i>Botaurus stellaris</i>	En danger
<i>Ixobrychus minutus</i>	En danger
<i>Nictycorax nictycorax</i>	Vulnérable
<i>Ardeola ralloides</i>	En danger
<i>Egretta garzetta</i>	Vulnérable comme nicheur
<i>Ardea cinerea</i>	En danger comme nicheur
<i>Ardea purpurea</i>	En danger au Maroc
<i>Ciconia ciconia</i>	En déclin ?
<i>Plegadis falcinellus</i>	En danger comme nicheur
<i>Geronticus eremita</i>	En danger, en danger critique mondialment
<i>Platalea leucorodia</i>	En danger comme nicheur
<i>Milvus milvus</i>	Menacé de disparition comme nicheur
<i>Gypaetus barbatus barbatus</i>	Menacé de disparition, endémique du Maghreb
<i>Neophron percnopterus</i>	Menacé de disparition
<i>Gyps fulvus</i>	Menacé de disparition
<i>Circus pygargus</i>	Rare comme nicheur
<i>Melierax metabates theresae</i>	Menacé de disparition, sous-espèce endémique marocaine, d'origine afro-tropicale
<i>Aquila rapax belisarius</i>	Menacé de disparition, endémique maghrébin
<i>Aquila chrysaetos</i>	Rare
<i>Pandion haliaetus</i>	En danger comme nicheur
<i>Falco naumanni</i>	Rare, vulnérable mondialement
<i>Falco eleonorae</i>	En danger, endémique méditerranéen
<i>Turnix sylvatica</i>	Menacé de disparition, d'origine indo-africaine
<i>Rallus aquaticus</i>	En danger comme nicheur
<i>Porzana pusilla</i>	En danger comme nicheur
<i>Porphyrio porphyrio</i>	En danger, d'origine indo-africaine
<i>Fulica atra</i>	Rare comme nicheur
<i>Fulica cristata</i>	Vulnérable au Maroc, d'origine tropicale
<i>Tetrax tetrax</i>	Menacé de disparition, quasi menacé mondialement
<i>Chlamydotis undulata</i>	Menacé de disparition, vulnérable mondialement, espèce saharienne
<i>Otis tarda</i>	Menacé de disparition, seule population africaine, vulnérable mondialement
<i>Himantopus himantopus</i>	Rare comme nicheur
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Vulnérable comme nicheur
<i>Glareola pratincola</i>	Vulnérable
<i>Vanellus vanellus</i>	Menacé de disparition, seule population africaine

<i>Larus genei</i>	En danger comme nicheur
<i>Larus audouinii</i>	Vulnérable comme nicheur, quasi menacé mondialement, endémique méditerranéen
<i>Sterna nilotica</i>	Vulnérable comme nicheur
<i>Sterna hirundo</i>	En danger comme nicheur
<i>Sternula albifrons</i>	Vulnérable
<i>Chlidonias hybrida</i>	En danger
<i>Pterocles lichtensteinii</i>	Espèce saharienne
<i>Pterocles coronatus</i>	Espèce saharienne
<i>Pterocles senegallus</i>	Espèce saharienne
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Espèce indo-africaine
<i>Clamator glandarius</i>	D'origine tropicale
<i>Asio capensis tingitanus</i>	Menacé de disparition, sous-espèce endémique marocaine
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Endémique ibéro-maghrébin
<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Espèce saharienne
<i>Merops persicus</i>	D'origine indo-africaine
<i>Picus vaillantii</i>	Endémique d'Afrique du Nord
<i>Eremopterix nigriceps</i>	Espèce saharo-sahélienne
<i>Ammomanes deserti payni</i>	Sous-espèce endémique du Maroc
<i>Chersophilus duponti</i>	Endémique ibéro-maghrébin
<i>Rhamphocoris clotbey</i>	Espèce saharienne
<i>Galerida randonii</i>	Endémique d'Afrique du Nord
<i>Eremophila alpestris atlas</i>	Localisé au niveau des hautes montagnes, sous-espèce endémique marocaine
<i>Riparia paludicola mauritanica</i>	Sous-espèce endémique du Maroc
<i>Motacilla alba subpersonata</i>	Sous-espèce endémique du Maroc
<i>Pycnonotus barbatus</i>	D'origine tropicale
<i>Prunella collaris</i>	Localisé dans les milieux montagnards
<i>Phoenicurus moussieri</i>	Endémique d'Afrique du Nord
<i>Oenanthe oenanthe seebohmi</i>	Localisé dans les milieux montagnards, sous espèce endémique marocco-algérienne
<i>Scotocerca inquieta theresae</i>	Sous-espèce endémique du Maroc, d'origine tropicale
<i>Hippolais opaca</i>	Endémique ibéro-maghrébin
<i>Sylvia deserti</i>	Espèce saharienne
<i>Sylvia desrticola maroccana</i>	Sous-espèce endémique du Maroc
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Endémique ibéro-maghrébin
<i>Ficedula speculigera</i>	Endémique d'Afrique du Nord
<i>Turdoides fulva maroccanus</i>	Sous-espèce endémique du Maroc, espèce saharienne d'origine tropicale
<i>Cyanistes teneriffae</i>	Endémique d'Afrique du Nord
<i>Sitta europea hispaniensis</i>	Localisé dans les forêts humides de montagnes, sous-espèce endémique ibéro-maghrébine
<i>Tchagra senegalus</i>	D'origine tropicale
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Localisé dans les milieux montagnards
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Localisé dans les milieux montagnards
<i>Corvus ruficollis</i>	Espèce saharienne
<i>Passer simplex</i>	Espèce saharienne
<i>Rhodopechys sanguineus</i>	Localisé dans les milieux montagnards
<i>Bucanetes githagineus</i>	Espèce saharienne
<i>Emberiza sahari</i>	Endémique d'Afrique du Nord, espèce saharienne
<i>Emberiza schoeniclus witherbyi</i>	Menacé de disparition, localisé, seule population africaine, sous-espèce endémique ibéro-maghrébine

Cette Brochure présente une liste de 95 espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial pour le Maroc, détaillée sous forme de fiches pour 55 d'entre elles. Elle constitue une introduction à l'élaboration d'une «liste rouge pour les oiseaux» au Maroc.

C'est un document d'information et de sensibilisation ayant pour objectif principal la contribution à l'amélioration de la prise de conscience sur les lourdes menaces qui pèsent sur une partie significative du peuplement avien du pays.



SEO/BirdLife



Royaume du Maroc



Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte Contre la Désertification